

Kultúra	Károsító	dózis (kg/ha)	víz (l/ha)	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
alma	levéltetvek	0,125	600-1500	2	7	érés (BBCH 82)
alma	pajzstetvek, almamoly	0,25-0,4	600-1500	2	7	érés (BBCH 82)
alma	cserebogarak, levél- aknázómolyok	0,4	600-1500	2	7	érés (BBCH 82)
körte	körte-levélbolha	0,5	600-1500	1	–	50% gyümölcsméret (BBCH 82)
cseresznye, meggy	levéltetvek	0,125	600-1200	1	–	érés kezdete (BBCH 82)
cseresznye, meggy	cseresznyeléggy, cserebogarak	0,2-0,3	600-1200	1	–	érés kezdete (BBCH 82)
szilva	levéltetvek	0,125	600-1200	2	7	érés (BBCH 82)
szilva	szilvadarazsak	0,25	600-1200	2	7	érés (BBCH 82)
őszibarack, nektarin	levéltetvek	0,125	600-1200	2	7	érés (BBCH 82)
őszibarack, nektarin	molykártevők	0,3	600-1200	2	7	érés (BBCH 82)

őszibarack, nektarin	cserebogarak, pajzstetvek	0,2-0,3	600-1200	2	7	érés (BBCH 82)
kajszibarack	sodrómolyok, szilva-levélbolha	0,3-0,375	600-1000	2	7	érés (BBCH 82)
szőlő	amerikai szőlőkabóca, tarka szőlőmoly, nyerges szőlőmoly, pajzstetű fajok, szőlő-gyökértetű levéllakó alakja, pettyesszárnú muslica	0,25-0,375	400-800	1	–	érés (BBCH 82)
dió	levéltetű fajok, pajzstetű fajok, dióburok-fúrólégy	0,4	800-1500	3	14	betakarítás előtt 30 nappal (BBCH 82)
kukorica	amerikai kukoricabogár	0,15	300-500 (légi-80)	1	–	címerhányás vége (BBCH 59)
lucerna magtermesztés	csipkézőbogár fajok, lucernapoloska, lucernabimbó-gubacsszúnyog, somkóró-bagolylepke, lucerna-magdarázs	0,2	200-500	2	14	hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 75)
őszi káposztarepce, mustár, olajretek	levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár-ormányos	0,15-0,2	200-400 (légi-80)	1	–	virágzás (BBCH 67)
napraforgó	levéltetvek	0,15-0,2	300-400	1	–	virágzat elkülönülése (BBCH 53)
dohány	levéltetvek	0,125	300-400	2	7	virágzás (BBCH 62)
dohány	dohánytripsz	0,4	300-400	2	7	virágzás (BBCH 62)
paprika (hajtatott)	levéltetvek	0,125	400-800	2	7	első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71)

paprika (hajtatott)	nyugati virágtripsz	0,4	400-800	2	7	első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71)
paradicsom, tojásgyümölcs (hajtatott)	üvegházi molytetű	0,25	400-600	2	7	első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71)
uborka, cukkini (hajtatott)	levéltetvek	0,125	400-800	2	7	érés kezdete (BBCH 80)
saláta (szabadföldi és hajtatott)	levéltetvek	0,125	400-800	2	7	70%-os levéltömeg (BBCH 47)
bimbós kel	levéltetvek, földibolhák, káposztalégy, repceszár-ormányos, káposzta-bagolylepke, káposztalepke	0,25	400-800	1	–	végleges főhajtáshossz (BBCH 58)
zöldborsó	csipkézőbogár fajok, borsómoly, akácmoly, fésűslábú viráglégy, borsótripsz	0,2	200-500	2	14	hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 75)
zöldbab	csipkézőbogár fajok, bagolylepkék, fésűslábú viráglégy, dohánytripsz	0,2	200-500	2	14	hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 75)
fűszernövények	szívó-és rágókártevők	0,25	400-800	2	7	minimum 7 nappal a kezelés előtt, figyelembe véve az ÉVI-t
dísznövények	szívó-és rágókártevők	0,06-0,5	500-1500	2	7	nincs korlátozás
erdészeti kultúrák	szívó-és rágókártevők	0,2-0,3	400-1200 (légi-70-80)	2	14	nincs korlátozás